

本書の記載内容に誤りがございました。

訂正させていただきますとともに、謹んでお詫び申し上げます。

株式会社 総合医学社

23 ページ 表2 (下表)   内訂正

(正)

表2 脱水症の血清 Na 濃度による分類

	低張性	等張性	高張性
血清 Na 濃度 (mEq/L)	<130	130~150	150<
喪失量 (水 : mL/kg)	40~80	110~150	20~170
喪失量 (Na : mEq/kg)	10~14	7~11	2~5
喪失量 (K : mEq/kg)	10~14	7~11	2~5
Cl+HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mEq/kg)	20~28	14~22	4~10
細胞外液量	極めて減少	明らかに減少	減少
細胞内液量	増加	維持	減少
神経症状	嗜眠	嗜眠	興奮
腱反射	出る	少ない	出ない
血 圧	かなり低下	低 下	やや低下
脈	速 脈	速 脈	やや速脈
皮膚 (緊張度)	かなり低下	低 下	やや低下
皮膚 (感触)	ねっとり	乾 燥	ねばねば
粘 膜	やや湿った	乾 燥	からからに乾燥
大泉門・眼窩陥凹	著 明	著 明	軽 度
チアノーゼ	あ り	あ り	軽 度

548 ページ 表2 (下表)   内 (誤) 600 日以上, 1 歳以降 → (正) 60 日以上, 1 歳以降

(正)

表2 任意接種のワクチン

ワクチン	種 類	回 数	接 種	間 隔	接種年齢	接種法	接種量
おたふくかぜ	生	1	—	—	≥1 歳	皮下注	0.5 mL
水 痘	生	1	—	—	≥1 歳	皮下注	0.5 mL
インフルエンザ	不活化	2~1	1 回目	1~4 週	≥6 ヵ月	皮下注	≥13 歳 0.5 mL 6~12 歳 0.3 mL 1~5 歳 0.2 mL <1 歳 0.1 mL
			2 回目				
インフルエンザ菌 b 型 (Hib)	不活化	4*	1 回目	4~8 週 4~8 週 約 1 年	2 ヵ月~ 5 歳未満	皮下注	0.5 mL
			2 回目				
			3 回目				
			追加				
結合型 肺炎球菌	不活化	4**	1 回目	4 週以上 4 週以上 60 日以上, 1 歳以降	2 ヵ月~ 10 歳未満	皮下注	0.5 mL
			2 回目				
			3 回目				
			追加				
ヒトパピローマ ウイルス	不活化	3	1 回目	1 ヵ月 5 ヵ月	≥10 歳	筋注	0.5 mL
			2 回目				
			3 回目				
B 型肝炎	不活化	3	1 回目	1 ヵ月 6 ヵ月	≥0 歳	皮下注 筋注	≥10 歳 0.5 mL <10 歳 0.25 mL
			2 回目				
			3 回目				
A 型肝炎	不活化	3	1 回目	2~4 週 24 週	≥16 歳	皮下注 筋注	0.5 mL
			2 回目				
			3 回目				

\*1 回目接種の年齢が 2~7 ヵ月未満の場合は 4 回, 7~12 ヵ月未満の場合は 3 回, 12 ヵ月~5 歳未満の場合は 1 回。  
\*\*1 回目接種の年齢が 2~7 ヵ月未満の場合は 4 回, 7~12 ヵ月未満の場合は 3 回, 12 ヵ月~2 歳未満の場合は 2 回, 2 歳以降は 1 回。