


# オペ看ノート 正誤表

本書の第1刷、第2刷に記載内容に誤りがございました。訂正させていただきますとともに、謹んでお詫び申し上げます。

株式会社 総合医学社

該当箇所	正
136 頁	<p>脊髄くも膜下腔に局所麻酔薬を投与して脊髄前根・後根を遮断する麻酔方法。脊椎麻酔、腰椎麻酔、下半身麻酔とも呼ばれる。適応は、下腹部以下で2時間程度の手術。</p>  <p>くも膜下腔は、脳脊髄液で満たされている。</p> <p>脊髄はL1～L2で終わる。脊髄損傷を避けるためにL2とL3の間か、L3とL4の間に穿刺する。</p> <p>※L…腰椎。第1腰椎なら、L1と表記する。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p><b>絶対的禁忌</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 高度のショック状態</li> <li>・ 出血傾向</li> <li>・ 重症心不全</li> <li>・ 穿刺部の感染</li> <li>・ 頭蓋内圧亢進患者</li> </ul> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p><b>相対的禁忌</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 脊柱が高度に変形している場合</li> <li>・ 高度の肥満</li> </ul> </div> </div>
141 頁	<p>硬膜外腔に局所麻酔薬を投与して、鎮痛を得るもの。エピドラ、エピとも呼ばれる。全身麻酔と併用し、カテーテルを留置し術後も鎮痛に使用することが多い。適応は、頭部、顔面以外の全ての手術。</p>  <p>硬膜外腔は陰圧！</p> <p><b>【穿刺部位】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>開胸：Th4-8</li> <li>乳房：Th3-6</li> <li>胃・肝臓の手術：Th8-10</li> <li>腎臓・上部尿管の手術：Th8-11</li> <li>小腸の手術：Th10-12</li> <li>大腸・直腸の手術：Th10-L1</li> <li>帝王切開術：Th10-L2</li> <li>下肢：L2-4</li> </ul> <p>※Th…胸椎 L…腰椎</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p><b>絶対的禁忌</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 患者の協力が得られない場合</li> <li>・ 高度のショック状態</li> <li>・ 出血傾向</li> <li>・ 重症心不全</li> <li>・ 穿刺部の感染</li> <li>・ 頭蓋内圧亢進患者</li> </ul> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p><b>相対的禁忌</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 脊柱が高度に変形している場合</li> <li>・ 高度の肥満</li> </ul> </div> </div>